

# pantogar®

*queratina - cistina  
pantotenato de cálcio e associações*



Vida nova  
para o cabelo

## **Indicações**

Perda difusa de cabelos (perda de cabelo por razões desconhecidas).

Alterações degenerativas na estrutura de cabelo (cabelo enfraquecido, fino, não maleável, quebradiço, sem vida, opaco e sem cor), cabelos danificados pela luz do sol e radiação UV, prevenção do aparecimento de fios brancos.

Desordens no crescimento das unhas (unhas quebradiças, rachadas e pouco maleáveis).

## **Forma farmacêutica e apresentações**

30 e 90 cápsulas.

Contendo 60 mg de pantonato de cálcio, 20 mg de cistina e 20 mg de queratina

## **USO ADULTO**

### **Contra-Indicações**

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

### **Cuidados e Advertências**

Uma vez que a formação dos cabelos ocorre lentamente, é importante tomar Pantogar® regularmente na dose prescrita por um período de 3 a 6 meses para garantir o sucesso do tratamento.

Pantogar® não é indicado para alopecia cicatricial ou androgenética/convencional (calvície masculina). Entretanto, nestes casos, Pantogar® pode fortalecer os cabelos remanescentes. A alopecia cicatricial se caracteriza pela ausência ou diminuição definitiva dos pêlos, podendo ser causada por traumas, queimaduras químicas ou físicas, infecções por fungos, bactérias, vírus ou outros parasitas, câncer interno e

doenças, tais como: líquem plano pilar, lupus eritematoso, esclerodermia, mucinose folicular.

Se os sintomas persistirem ou se o objetivo do tratamento não for alcançado, consulte seu médico.

### **Interações Medicamentosas**

Não são conhecidos relatos de interação de Pantogar® com outros medicamentos, alimentos, tabaco ou álcool. Entretanto, caso tenha sido tratado com um medicamento que contenha uma sulfonamida (por exemplo: sulfabenzamida, sulfacetamida, sulfacloropiridazina, sulfacrisoidina, sulfadiazina, sulfametoxazol), informe seu médico antes de usar Pantogar®.

### **Reações Adversas**

**Gravidez** - Recomenda-se que Pantogar® seja utilizado apenas na segunda metade da gestação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Lactação** - Não são conhecidas restrições para o uso do produto durante a lactação.

**Pediatria** - Não se recomenda o uso do produto por crianças menores de 12 anos de idade, uma vez que não foram realizados estudos específicos para esta faixa etária.

**Geriatrics (idosos)** - Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes idosos. Insuficiência renal/hepática Não são conhecidas restrições para o uso do produto por pacientes com insuficiência renal ou hepática. Não há contra-indicação relativa.

Foram relatados raros casos de reações de intolerância ao medicamento, tais como: aumento repentino do suor, pulso acelerado, reações dermatológicas como coceira e urticária ou desconforto gastrointestinal como queimação, náuseas, gases e dor abdominal.

**Posologia**

Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo:

Adultos: 1 cápsula, 3 vezes ao dia, por via oral. Crianças maiores de 12 anos de idade: 1 a 2 cápsulas ao dia, de acordo com a idade, por via oral.

A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento pode ser continuado ou repetido.

Venda sob prescrição médica

Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior - CRF-SP nº 5.143

**A PERSISTIREM OS SINTOMAS,  
O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO**